

تعليمات منزلية الإجهاض الطبي: طريقة حبوب

اقرأ هذه التعليمات عدة مرات قبل إجراء إجهاضك الطبي.
اتصل بنا إذا كان لديك أي أسئلة على 313-538-2020

الميسوبروستول الذي تلقيته في حقيبة المنزلية هو الخطوة الثانية لإنجاح الإجهاض الطبي. يسبب الميزوبروستول تقلصات الرحم والتزيف الذي يطرد الحمل. اتبع الإرشادات أدناه لطريقة الجرعات المنقولة عليها مع مستشارك:

★ 30 دقيقة قبل إعطاء الميزوبروستول نوصي بتناول حبة واحدة ميكيليزيب (لختيان) و 1 إيبوبروفين 800 (للإزعاج)

المهبل (الطريقة المفضلة): بعد 24 إلى 72 ساعة من تناول الميفيريستون، اغسل وجهك تماماً بالماء المثلث الماء. اغسل يديك جيداً، وضع 4 أقراص ميزوبروستول في أداة الوضع وضع الحبوب في عمق المهبل، بالقرب من عنق الرحم. حاول أن لا تكون على قدميك لمدة ساعة بعد الإدخال. توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل للحصول على أفضل فرصة للنجاح.

الشفق: بعد 24 إلى 48 ساعة من تناول الميفيريستون، ضع 4 أقراص من الميزوبروستول بالطريقة الشدقية (بين أسفل الخد والثلاة السفلية) لمدة 30 دقيقة. ثم اشرب رشبة صغيرة من الماء وابتلع أي أجزاء متبقية من الحبوب.

تحت اللسان: بعد 24 إلى 48 ساعة من تناول الميفيريستون، ضع 4 أقراص من الميزوبروستول تحت اللسان (تحت لسانك) واحتفظ بها هناك لمدة 30 دقيقة. ثم اشرب رشبة صغيرة من الماء وابتلع أي أجزاء متبقية من الحبوب.

★ إذا لم يحدث أي نزف خلال 48 ساعة من الجرعة الأولى من الميزوبروستول، كرر الميزوبروستول باستخدام 4 أقراص الميزوبروستول المتبقية.

★ المرضى الذي يزيد من 9 أسابيع من الحمل سيُنصح بتناول أقراص الميزوبروستول الأربعة المتبقية بعد 4 ساعات من الجرعة الأولى.

ماذا يمكنني أن أتوقع أن يحدث بعد ذلك؟

- النزف والتشنج يبدأ عادة بعد 2 إلى 4 ساعات من تناول أقراص الميزوبروستول. يستجيب كل رحم بشكل مختلف - قد يبدأ بعض المرضى في وقت مبكر أو متأخر عن هذا الإطار الزمني المعتاد. إن تشنج أسفل البطن والتزيف علامة على أن أنسجة الحمل تمر عبر عنق الرحم.
- عندما يحدث الإجهاض، يمكن أن يكون التزيف غزيراً مع وجود جلطات كبيرة. أبلغ بعض المرضى عن تزيف أقل وتشنج وتجلط أقل، ومع ذلك لا يزالون يموتون بالإجهاض. يمكن أن يستمر التزيف والتشنج لعدة ساعات. يمكن توقع تجلط الدم من حجم حبة البازلاء إلى حجم برنتالة. أنسجة الحمل نفسها صغيرة جداً وستطرد بين التزيف والجلطات. نحن على البقاء في المنزل خلال هذا الوقت. حينما مرر النسيج، سيخف التزيف والتشنج.
- يمكن أن يبدأ التزيف ويتوقف لعدة أسابيع، وقد يكون لديك تزيف حتى دورتك الشهرية التالية. استخدمي الفوط الصحية الماكسي حسب الحاجة حتى تحصلى على دورتك الشهرية التالية (عادة حوالي 4 إلى 8 أسابيع).

للألم / عدم الارتيان:

- إيبوبروفين 800 هو الخيار الأفضل للتشنج؛ تناوله كل 6-8 ساعات. تم إرسال وصفة طبية لـ Tylenol (أسيتامينوفين مع الكوديين) إلى الصيدلية الخاصة بك للألم لا يسيطر عليه الإيبوبروفين؛ تناوله كل 4-6 ساعات إذا لزم الأمر.
- الشعور بالمرض، أو الشعور بألم / عدم راحة في البطن، أو الإسهال، أو القيء، أو الحمى، أو القشعريرة، أو الضعف بعد أكثر من 24 ساعة من تناول الميزوبروستول قد يشير إلى إصابتك بعوى خطيرة. اتصل بمركز سكوتسلندي النساء (SWC) على الرقم 538-2020 (313) فوراً إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض.

- من المهمأخذ درجة حرارة دقيقة! لا تفحص درجة حرارتكم خلال نصف ساعة من التدخين أو الشرب أو الأكل. قد تغير هذه القراءة الحقيقة لميزان الحرارة. اتصل بنا على الفور إذا وصلت درجة حرارتكم إلى 100.4 درجة فهرنهايت أو 38 درجة مئوية.
- اتصل بالعيادة على الفور إذا قمت بنقع فوطتين خلال ساعة أو إذا كان لديك جلطات دموية بحجم قبضة اليد. يمكنك أيضاً الرجوع إلى الرسم التخطيطي للتزيف في الصفحة الأخيرة من هذا المستند.

-

اتصل بنا إذا كنت تعاني من ألم لا يمكن السيطرة عليه باستخدام الطرق المذكورة أعلاه.

بعد الإجهاض الطبي

-

هرمونات الحمل قد تسبب ألم الثدي. حمالة الصدر المريحة والوثيرة قد توفر الراحة.

-

استأنف الأنشطة المعتادة، على سبيل المثال: المدرسة أو العمل أو القيادة، كما تشعر بذلك.

-

من الآمن أن تمارس الجنس المحمي عندما تكون مستعدًا، لكن أعلم أنه يمكنك الحمل فوراً بعد الإجهاض. إذا لم تختر طريقة منع الحمل أثناء وجودك في

-

العيادة، يمكنك الاتصال بنا للقيام بذلك أو الاتصال بطبيبك. كما نحمل حبوب منع الحمل لل صباح التالي.

المتابعة

-

سيتلقى جميع المرضى مكالمة متابعة في الأيام التي تلي إدخال حبوب منع الحمل. تساعدنا هذه المحادثة في تحديد ما إذا كان إجهاضك قد اكتمل.

-

فقط المرضى الذين تجاوزت فترة حملهم 9 أسابيع وقت الإنتهاء سيحددون موعدًا للمتابعة شخصياً. المرضى الذين تقل مدة حملهم عن 9 أسابيع سيكون

-

لديهم مواعيد متابعة شخصية فقط حسب الحاجة.

-

إذا تم تحديد أن نسيخ الحمل لم يمر أو كان لديك اختبار حمل إيجابي بعد 4 أسابيع من موعدك، فسيتم تحديد موعد شخصي. سيقوم الطبيب بتقييمك

-

ويقرر ما إذا كانت جرعة ثلاثة من الميزوبروستول أو إكمال جراحي للإجهاض ضرورية.

علامات الحمل المستمرة: علامات الحمل المستمرة: يجب أن تختفي أي علامات أو أعراض للحمل في أول 72 ساعة بعد الإجهاض الدوائي. لا تأخذني اختبار الحمل قبل 4 أسابيع من إجراءك. تحتاج هرمونات جسمك إلى وقت للعودية إلى مستوياتها الطبيعية بعد الحمل.

المشاعر: تختلف المشاعر بعد الإجهاض من شخص لآخر. يشعر بعض الناس بالحزن والبعض الآخر يشعر بالارتياب. يمكنك الاتصال بـ SWC إذا كنت ترغب في مناقشة مشاعرك. يمكنك أيضًا الذهاب إلى www.detroitabortioncenter.com/aftercare-instructions لاستكشاف موارد ما بعد الإجهاض.

الرعاية الذاتية: اشتري علبة كلينكس وبعض الشوكولاتة وشاهد فيلماً عاطفياً إذا احتجت إلى البكاء! تذكر أن تبقى رطباً.

HOW MUCH AM I BLEEDING?

Scant amount
Blood only on tissue
when wiped or less than
one-inch stain on maxi pad
within one hour.



Moderate amount
Less than six-inch stain on
maxi pad within one hour.

كمية معتدلة
اقل من ٦ بوصات على فوطة ماكسي خلال
ساعة واحدة.

Heavy amount
Saturated maxi pad within one hour.

**كمية حادة (أكثر من
المعتاد)**

مشبعة فوطة ماكسي
خلال ساعة واحدة.

Developed by Planned Parenthood of Western Washington

مقدار النزيف

كمية ضئيلة

الدم فقط على ورق التواليت عند مسحه او
ظهور بقع أقل من بوصة واحدة على فوطة
ماكسي خلال ساعة واحدة.

كمية خفيفة

اقل من ٤ بوصات على
فوطة ماكسي خلال
ساعة واحدة.

كمية معتدلة

اقل من ٦ بوصات على فوطة ماكسي خلال
ساعة واحدة.