

RESUMEN DE INSTRUCCIONES

Consulte las instrucciones completas para el hogar para obtener información detallada.

RECUERDE:

- Lea detenidamente todas las “instrucciones para tratamiento en casa”
- Recoja de la farmacia todos los medicamentos ANTES de tomar misoprostol
- Tome suficiente agua y líquidos para mantenerse hidratada
- Tenga toallas femeninas a la mano
- Come pocas cantidades de comida para evitar náuseas
- Tenga un termómetro a la mano para tomarse la temperatura oral

DIA 1 - DIA DE LA CITA

- Tome la tableta Mifeprex cuando este con el doctor - puede experimentar cólicos o un poco de sangrado
- Si siente náuseas en cualquier momento del proceso (hoy, mañana u otra día), tome el medicamento proporcionado para las náuseas llamado meclizine - 1 tableta cada 8 horas

DIA 2:

- 30 minutos antes de la inserción, tome 1 tableta de ibuprofeno (para los cólicos) y 1 de meclizine (para las náuseas)
- Lave y seque muy bien el aplicador de las tabletas
- Inserte 4 tabletas de misoprostol vaginalmente
 - Pacientes con mas de 9 semanas de embarazo tienen que insertar las 4 tabletas que faltan de misoprostol 4 horas después de LA primera dosis
- Cólicos, sangrados y coágulos de sangre pueden empezar a los 45 minutos después de la inserción y durar hasta 12 horas
- Tome ibuprofeno cada 6-8 horas para los cólicos cuando sea necesario
- Puede alternar el ibuprofeno con Tylenol 3 si necesario

EN LOS SIGUIENTES DIAS

- El sangrado debe de ir disminuyendo
- Ya no debe de haber cólicos
- Usted debe de sentirse bien de nuevo
- No haga una prueba de embarazo antes de las 4 semanas

PACIENTES CON MAS DE 9 SEMANAS DE EMBARAZO DEBEN DE REGRESAR A LA CLINICA PARA UN CHEQUEO DE SEGUIMIENTO